

11 kwietnia 2025

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie



Łuków, dnia 08 kwietnia 2025r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ŁUKOWIE

Agnieszka Dymek

Hodowcy zwierząt gospodarskich !!!

W związku z występowaniem pryszczycy w krajach sąsiednich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie apeluje o stosowanie niżej wymienionych zasad bioasekuracji:

- Zwierzęta wprowadzane do gospodarstwa muszą pochodzić **z wiadomego źródła, być zidentyfikowane i oznakowane**
- Konieczne jest **ograniczenie odwiedzin w gospodarstwach osób postronnych** do niezbędnego minimum
- Należy prowadzić w gospodarstwach **rejestr wejść i wyjść osób oraz ruchu pojazdów** (wjazdy i wyjazdy)
- Wprowadzone (zakupione, przemieszczone) zwierzęta do stada powinny zostać **odizolowane i poddane kwarantannie minimum 14 dni z rozszerzeniem do 21 dni**
- W wejściach do budynków inwentarskich powinno się stosować **maty** (kuwety) ze środkiem dezynfekcyjnym (działającym na wirusa pryszczycy) który należy na bieżąco uzupełniać
- Należy bezwzględnie przestrzegać higieny osobistej, zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do budynków inwentarskich
- Należy ograniczyć do minimum kontakt zwierząt z gospodarstwa z innymi zwierzętami (pastwiska, wybiegi)

Obecnie na terenie Polski nie stwierdzono wirusa pryszczycy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Łukowie

Agnieszka Dymek

W załączeniu: **ulotka dotycząca FMD- pryszczycy**



Sporządziła: Marta Lech-Dybczak – inspektor weterynaryjny zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Warszawska 16, 21-400 Łuków

tel.: (25) 798-26-13, fax: (25) 798-25-19, e-mail: lukow.piw@wiw.lublin.pl.

Pryszczycza (FMD)

Choroba



Pryszczycza to choroba zwierząt parzystokopytnych udomowionych i wolno żyjących (w tym bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych, bawołów, jeleni). Powoduje powstawanie pęcherzy głównie w jamie ustnej i na kończynach. Objawy u zakażonych zwierząt: obfite ślinienie, mlaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronienia.

U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, kozłat, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.

Transmisja




Pryszczycza jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa. Możliwe jest przenoszenie wirusa wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt.

Może wystąpić przenoszenie drogą kropelkową (obecność wirusa w aerozolu).

Zapobieganie

Środek
dezynfekujący do
izolacji



Ryzykowne zachowania zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym sposobem ochrony stada.

Ochrona stada w przypadku podejrzenia wystąpienia ognisk choroby w pobliżu:

Unikaj:

- kontaktów między zwierzętami z różnych stad, np. na pastwisku, przez ogrodzenie);
- zwiedzania innych miejsc, w których przebywają zwierzęta;
- korzystania ze wspólnych narzędzi, sprzętu, pojazdów, personelu z innymi gospodarstwami.

Stosuj:

- oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;
- dezynfekcję obuwia przed wejściem do budynku ze zwierzętami

Szczepionki przeciwko pryszczycy są dostępne i muszą być stosowane wyłącznie z instrukcjami służb weterynaryjnych.

Świadomość



Choroba może powodować różne bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne. Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie wszystkich zwierząt. Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej. Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.